

Problème 1

On considère un ensemble non vide \mathbb{E} , et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de \mathbb{E} .
On note

$$\liminf X_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} X_p \right)$$

$$\limsup X_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} X_p \right)$$

1. Soit $x \in \mathbb{E}$.

- Traduire à l'aide des quantificateurs, $x \in \liminf X_n$.
- Traduire de même $x \in \limsup X_n$.

2. En déduire que pour toute famille (X_n) de parties de \mathbb{E} on a :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X_n \subset \liminf X_n \subset \limsup X_n \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$$

On dira qu'une suite (X_n) de parties de \mathbb{E} est *convergente* si $\limsup X_n = \liminf X_n$.

- Si $\mathbb{E} = \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = \{n\}$, est ce que la suite (X_n) est convergente?
- Montrer que si (X_n) est une suite croissante pour l'inclusion (i.e: $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \subset X_{n+1}$), alors (X_n) est convergente.
- Trouver un exemple de suite de parties de \mathbb{E} non convergente.
- Montrer que si la suite (X_n) converge, alors la suite des complémentaires $(Y_n = \bar{X}_n)$ est aussi convergente.
- Si (X_n) et (Y_n) sont deux suites de parties de \mathbb{E} , montrer que:

$$\limsup(X_n \cap Y_n) \subset (\limsup X_n) \cap (\limsup Y_n)$$
- En déduire que si (X_n) et (Y_n) sont deux suites convergentes, alors la suite $(Z_n = X_n \cap Y_n)$ est également convergente.
- Montrer que si (X_n) et (Y_n) sont deux suites convergentes, alors la suite $(Z_n = X_n \cup Y_n)$ est convergente.

Problème 2: Méthode de Cardan

Dans toute la suite, on considère l'équation:

$$x^3 + px + q = 0 \quad (1)$$

p et q étant deux nombres complexes

Partie I : Soit α l'une des racines (réelles ou complexe) de (1).

10. Montrer qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{C}$ vérifiant :

$$u + v = \alpha \text{ et } uv = -\frac{1}{3}p.$$

11. Exprimer $u^3 + v^3$ et u^3v^3 en fonction de p et q et en déduire que u^3 et v^3 sont racines de l'équation:

$$Z^2 + qZ - \frac{1}{27}p^3 = 0 \quad (2)$$

Partie II : Soient inversement z_1 et z_2 les racines (réelles ou complexes) de l'équation (2).

12. Montrer que l'on peut choisir une racine cubique (dans \mathbb{C}) u de z_1 et une racine cubique v de z_2 telles que $uv = -\frac{1}{3}p$.

13. Vérifier que les trois racines α, β et γ de l'équation (1) sont:

$$u + v, u\omega + v\omega^2 \text{ et } u\omega^2 + v\omega, \text{ désignant le complexe } -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

14. Dans cette question, on suppose p et q réels et on pose $D = q^2 + \frac{4}{27}p^3$ qu'on suppose positif ou nul.

- Exprimer z_1 et z_2 en fonction de q et D .
- Montrer que l'on peut choisir u et v réels et exprimer les racines de (1) en fonction de q et D . Vérifier que l'une de ces racines est réelle.

Exemples : Résoudre les équations suivantes:

$$(a) \quad x^3 + 3x + 1 = 0 \quad (b) \quad x^3 - \frac{3}{2}\sqrt{2}x + 1 = 0 \quad (c) \quad x^3 + 3x + 2i = 0.$$